

“โรคล้มปี่ สกิน”

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่



รู้จัก “โรคลัมปี สกิน”

- ▶ เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน
- ▶ มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus
- ▶ เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
- ▶ อัตราการป่วยมากกว่า 5%



รู้จัก “โรคล้มปี สกิน”

- ▶ เชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ
- ▶ พบตุ่มเนื้องบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย
- ▶ ต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม
- ▶ สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย
- ▶ ในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65%



พาหะนำโรคลัมปี สกิน

- ▶ แมลงดูดเลือด เช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ
- ▶ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง
- ▶ ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค
- ▶ ผ่านทางรกได้



อาการของโรคลัมปี สกิน

- ▶ มีไข้สูง
- ▶ ต่อม้ำเหลืองโต
- ▶ มีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร
- ▶ ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย
- ▶ พบมากที่คอ หัว เต้านม อวัยวะและหว่างขา
- ▶ ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย มีหนองแมลงมาไช



อาการของโรคลัมปี สกิ้น

- ▶ พบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
- ▶ ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก
- ▶ อัตราการป่วยอยู่ที่ 5 - 45 %
- ▶ อัตราการตายน้อยกว่า 10%
- ▶ แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน
- ▶ ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง



มนุษย์ติดโรคลัมปี สกีน ได้หรือไม่?

- ▶ เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ
- ▶ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น
- ▶ ไม่แนะนำให้กินเนื้อวัวที่ป่วยเป็นโรค




การป้องกันโรคลัมปี สกิ้น

1. กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใส่สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่น
2. สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ



การป้องกันโรคลัมปี สกิน

1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
2. กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่
3. กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด





หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติ
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที
เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเร็วที่สุด

